

## خلاصه نکات داروهای جعبه اورژانس - ۴

شماره	نام دارو	توضیحات
۱	دیگوکسین	<p>آمپول نیم میلی گرم در دو سی سی هر یک سی سی با ۴ سی سی آب مقطر یا نرمال سالین رقیق شود ، تزریق آهسته طی ۵ دقیقه صورت گیرد.</p> <p>اینوتروپ، ضد آریتمی دهلیزی، در درمان نارسایی قلبی، فلوتر دهلیزی، فیبریلاسیون دهلیزی قبل از دادن هر دوز دیگوکسین نبض بیمار شمارش شود و در صورتیکه کمتر از ۶۰ باشد به پزشک گزارش شود. سطح پتاسیم سرم بیمار به طور مرتب پایش شود زیرا هیپوکالمی بیمار را مستعد به مسمومیت با دیگوکسین می نماید.</p> <p>در طول درمان با این دارو بیمار مکررا باید از نظر علائم مسمومیت با دیگوکسین پایش شود. این علائم عبارتند از آریتمی، استفراغ، تهوع، تاری دید، دیدن هاله اطراف اشیاء، گیجی و بی قراری</p>
۲	لابتولول	<p>آمپول ۵ mg/ml ، هر ۱۰ میلی گرم در طی ۱ تا ۲ دقیقه تزریق شود.</p> <p>درمان فشار خون خفیف تا شدید در طی تزریق فشارخون، تعداد ضربان قلب(از نظر برادی کاردی) و ECG بیمار باید مانیتور گردد. در حالت خوابیده تزریق گردد.</p>
۳	میدازولام	<p>آمپول ۵ میلی گرم در یک سی سی ضد اضطراب و آرامبخش، قبل از پروسیجرهای تشخیصی و عمل جراحی بعنوان آرام بخش استفاده می شود.</p> <p>دارو سریع تزریق نشود. هر ۱-۳ میلی گرم در طی ۲ تا ۳ دقیق تزریق گردد.</p> <p>ممکن است باعث دپرسیون تنفسی و نیز ایست تنفسی گردد. بنابراین وسایل احیا باید در دسترس باشد. بسته به دوز ممکن است تا چندین ساعت بیمار دچار اختلال هوشیاری شود.</p>
۴	فنوباریتال	<p>آمپول ۲۰۰ میلی گرم در ۲ سی سی ضد تشنج، سداتیو.</p> <p>با ۱۰ سی سی محلول سازگار مثل دکستروز ۵ درصد یا نرمال سیلین یا آب مقطر رقیق گردد. در هنگام تزریق سرعت تزریق نباید از ۶۰ میلی گرم در دقیقه بالاتر رود. تزریق سریع دارو باعث بروز ضعف شدید تنفسی می گردد.( وسایل احیا در دسترس باشد)</p> <p>قبل و طی تزریق دارو فشار خون، تعداد نبض، تعداد و عمق تنفس به ویژه در افرادی که مشکلات تنفسی دارند پایش شود. با توجه به محرک بودن دارو، از نشت دارو از رگ به بافت های مجاور اجتناب شود. ممکن است باعث ایجاد پارادوکس شود که علائم آن عبارتند از : هیجان، سرخوشی و بی قراری</p>